N° 15

Observation sur une suppression d'urine, avec oedeme au periné et scrotum qui determina la ponction audessus des os pubis a l'endroit ou se pratique l'operation du haut appareil par M. Brunet conseiller et 1er chirurgien de S. A. S. Mgr. le Duc regnant des deux ponts

un cytoyen de deux ponts agé de soixante ans, etoit sujet par intemperance a une dysurie qui devint strangurie faute des veritables secours que l'art fournit, tels que les saignees, les bains, les boissons addoucissantes, les lavements, les fomentations, embrocations et l'introduction de la sonde

le second jour la strangurie changa en ischurie. je fus mande la nuit du second au troisieme jour, le chirurgien qui l'avoit vu vingtquatre heures avant moy luy avoit fait deux saignees, appliqués des lavements et avoit tenté inutilement l'introduction de la sonde dans la vessie que je tentay egalement par toutes les manieres connués, mais envain

ARC 22 d. 2 n° 89
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Dans l'impossibilité de procurer au malade un bain pendant la nuit, je fus obligé de me restraindre aux secours d'une ample saignée et d'un lavement oleagineux

j'avois trouvé le scrotum et le périné dans une telle oedematie que l'on pouvoit soubsconner l'infiltration, la constitution du malade etant d'ailleurs cacochyme

le malade etoit dans des angoisses cruelles, le poulx devenoit plus petit et plus concentré de moment a autre avec intermission, la respiration des plus difficile et vomissant toute espece de boisson

cette situation exigeoit que l'on prit un party, j'hesitois si je luy ferois l'incision qui se pratique a l'appareil lateral, craignant par ce moyen hâter la putréfaction dont l'oedème menacoit le periné

pour y obvier autant qu'il seroit possible, je me determinay a faire la ponction audessus des os pubis, je mis le malade sur le bord de son lit, ses pieds sur deux chaises, je me placay dans l'interval

La tete du malade etoit panché en arriere, je posay un cousin pour remplir le vuide des lombes ainsi que pour retenir le malade dans les mouvements quil pouvoit faire pendant loperation, je dirigay le troicart entre les deux tetes des muscles droits et celles des pyramidaux

l'urine que le malade rendit par la ponction, avoit la couleur naturelle, cequi fortifia mon esperance pour la resolution de loedeme : levacuation finie je bouchois la canule avec un bouchon de cire enveloppé d'un linge, dans les anneaux de la quelle javois passé deux cordons qui ceignoient le corps. le malade couché sur le dos, je luy fis une embrocation avec lhuille rosat, jappliquay une flanelle soutenue par un bandage de corps, jessayay de faire prendre un bouillon au malade quil garda

je portay mon attention sur le periné et scrotum, sur les quelles parties jappliquay des compresses trempés dans moitie eau de vie ammoniacé et moitie eau commune, je soutins le scrotum avec des serviettes en guise de cousin, jordonnay que lón renouvella l'immersion des compresses toutes les demis heures

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

excepté que le malade ne reposa : pour sa boisson de l'eau de poulet ou de veau et pour sa nourriture du bouillon, le tout en petite quantite

je revins dans la matinee voir le malade qui avoit eu quelque repos, je debouchois la canule. l'ayant fais mettre sur son secan, les urines coulerent — j'examinay le scrotum et le periné, j'y appercus des phlictaines pleines d'eau que j'ouvris, je reconnus — que la tension oedemateuse de ces parties s'etoit borné, pour lors je ne mis dans l'eau de vie ammoniacé qu'un quart d'eau commune ; je fis faire des injections dans l'urethre avec de l'eau d'orge : le malade se trouvant bien de ces secours, je les continuay. le lendemain

le troisieme jour les urines commencerent a couler par le canal de l'urethre, le cours en etant devenu asses libre, j'otay la canule le quatrieme jour, je fis couler un peu de Beaume d'arceus dans la playe et je posay plusieurs compresses graduées sur la playe je recommanday au malade de se tenir tranquil et couché sur le dos ayant les cuisses flechies et elevées

j'ordonnay une plus ample boisson d'eau de poulet et des emulsions, le bouillon pour toute nourriture. j'eus soin de la tension oedemateuse du periné et scrotum en imbibant les compresses dans l'eau de vie ammoniacée pure, j'employay de tems a autre les injections avec l'eau d'orge surtout lorsque le malade vouloit uriner afin de lubrefier le canal de l'urethre

ces moyens continués, l'ouverture de la ponction bien reunie, l'oedeme du periné et scrotum totalement dissipés, le malade se leva le douzieme jour et a continué a se retablir parfaitement

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE